



Guía para realización de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio en pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19

Si bien las cirugías programadas se han suspendido para asegurar la disponibilidad de camas para los enfermos que requieran hospitalización, las cirugías de urgencia u oncológicas siguen realizándose, y es probable que algunas requieran monitoreo neurofisiológico intraoperatorio.

También puede ocurrir que un paciente con diagnóstico ya confirmado de COVID-19 requiera una cirugía. La definición de caso es dinámica y se actualiza permanentemente, puede ser consultada en <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso>

En algunas instituciones se cuenta con un área quirúrgica separada para **PACIENTE CON SOSPECHA/DIAGNÓSTICO CONFIRMADO COVID-19** (el cirujano debe pedir este quirófano y consignarlo así en la historia clínica).

La evidencia actual sugiere, de todas maneras, que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud que atienden a pacientes enfermos de **COVID-19**. Por ese motivo, se considera a **cualquier** persona que ingresa al quirófano como sospechosa (incluyendo al equipo de salud)

La presente es una guía basada en las recomendaciones del Comité de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Anestesia, Analgesia y Reanimación, y del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

- Sólo ingresarán al quirófano las personas que estén involucrados en la asistencia directa al paciente, tratando de minimizar al máximo el número de personas involucradas. **(no llevar técnicos, fellows, becarios, etc)**
- Antes de descender a la planta quirúrgica chequear si cumple con el **código de vestimenta**: pelo atado y totalmente cubierto por la cofia, uñas cortas sin esmalte, sin ningún tipo de accesorios (no reloj, pulsera, anillos, celular, tablet, estetoscopios, parlantes etc.) y con calzado adecuado sin orificios.

[Escriba aquí]

Todas las personas que se encuentren dentro del quirófano deberán tener Elementos de Protección Personal (EPP) **nivel 3**, colocados de la siguiente manera:

1. La **primera cofia** debe cubrir cabello y orejas y se debe contar con calzado adecuado sin officios.
2. Higiene de manos
3. Colocar **pantalón descartable** hidro repelente
4. Colocar **botas descartables** hidro repelentes
5. Colocar **barbijo n95** (Tiras paralelas, Realizar prueba de ajuste de barbijo N95.), para que dure más, conviene colocarse un barbijo quirúrgico común arriba.
6. Colocar **antiparras**
7. Colocar **segunda cofia**.
8. Colocar **máscara facial** (cubriendo la frente)
9. Lavado de manos 20 segundos como mínimo

Dentro del quirófano:

1. Colocarse **primer par de guantes** sobre piel
2. Colocarse **camisolín**.
3. Colocarse **segundo par de guantes**.
(en nuestro caso **no es necesario** que el camisolín o los guantes sean estériles, pero sí **deben cubrir los puños** del camisolín, NO DEBE QUEDAR PIEL EXPUESTA)

Acá unos videos explicativos:

Cómo ponerlos (orden):

<https://youtu.be/BscZ04rRhR4>

Cómo sacarlos, en orden:

<https://www.youtube.com/watch?v=qXmTq8D32Vs>

- En el momento de la intubación, aspiración, extubación, **todos deben salir del quirófano** porque existe aerosolización de secreciones.
(Sólo quedan el anestesiólogo y su asistente)
- **Limpiar nuestra mesa, los equipos (notebook, consola, preamplificador, estimuladores, etc) y cables** con soluciones detergentes específicas o solución de hipoclorito de sodio o alcohol al

[Escriba aquí]

70% (en una zona previamente asignada para esa tarea) antes y después!

[Escriba aquí]

Checklist de la AARBA para no olvidarse nada:



CHECKLIST PARA INSTRUMENTACIÓN DE VÍA AÉREA

INFECTADOS O CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS COVID-19

El checklist debe ser enunciado en voz alta

1 - CONFORT PERSONAL

OBJETIVO: Evitar distractores que desvíen la atención del operador

- BEBER AGUA.
- EVALUAR LA NECESIDAD DE IR AL BAÑO.
- QUITARSE ELEMENTOS PERSONALES (RELOJ, CADENA, ANILLOS, ETC).
- ANTEOJOS (FIJAR EN FRENTE O POSTERIOR CON CINTA PARA EVITAR QUE SE MUEVA).
- AMBO ABROCHADO.
- ZAPATOS CERRADOS (SIN ORIFICIOS) Y AJUSTADOS.
- CABELLO: FLEQUILLO HACIA ATRÁS. RODETE SI CABELLO LARGO.
- CONTAR CON UNA SILLA PARA CAMBIARSE.

2-HIGIENE DE MANOS

- 20 SEGUNDOS (POR LO MENOS) CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA AL 70%

3 - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

OBJETIVO: Revisar la disponibilidad de los elementos necesarios para la protección del operador

- COFIA DESCARTABLE.
- BOTAS CON NUDO-MOÑO LATERAL O ANTERIOR FÁCIL DE DESATAR.
- BARBIJO N95 CUBRIENDO MENTÓN Y NARIZ / COMPROBAR AJUSTE.
- GAFAS DE SELLADO HERMÉTICO Y/O PROTECTOR FACIAL.
- CAMISOLÍN HIDROREPELENTE. EN CASO DE SER POSIBLE, SE RECOMIENDA CORTAR LAS TIRAS DE AJUSTE INTERNAS, DEJANDO SÓLO LAS EXTERNAS Y PINTAR CON UN MARCADOR EL LADO INTERNO, PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN AL MOMENTO DE RETIRARLO.
- GUANTES CUBRIENDO MUÑECAS POR ENCIMA DEL CAMISOLÍN.